

Amicel Varroa

Solução para tiras para colmeia

Amitraz 25 mg/ml



FICHA
TÉCNICA



AMICEL VARROA Um ml contém: Amitraz 25 mg. **INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO** Tratamento de parasitoses externas causadas por ácaros Varroa destructor sensíveis ao amitraz **CONTRA-INDICAÇÕES** Não existem. **REAÇÕES ADVERSAS** Desconhecidas **ESPÉCIE(S)-ALVO** Abelha melífera (Apis mellífera). **POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO** Aplicação apícola. **INTERVALO(S) DE SEGURANÇA** Mel: 0 dias. Não utilizar durante o fluxo de mel. **PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO** Manter fora da vista e do alcance das crianças.. Conservar a temperatura inferior a 25 °C. **ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS** Todas as colmeias no apiário devem ser tratadas simultaneamente para prevenir a reinfestação por roubo. O uso indevido de medicamentos veterinários antiparasitários pode resultar em um risco aumentado de desenvolvimento de resistência e, em última análise, pode resultar em terapia ineficaz. Não reutilizar as tiras. A administração do medicamento veterinário deve ser feita em períodos com pouca criação na colmeia (quando o número de crias é baixo). Doses superiores às recomendadas não aumentam a eficácia do medicamento veterinário. Não utilizar mais do que a quantidade indicada (10 ml de solução) para preparar cada tira.. O amitraz é um inibidor da monoamina oxidase (iMAO), pelo que as pessoas a tomar medicamentos contendo iMAO devem ter um cuidado especial. Ao preparar e colocar as tiras, deve ser usado equipamento de proteção individual composto por luvas de borracha. Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do medicamento veterinário. Lavar meticulosamente as mãos em água após o manuseamento do medicamento veterinário. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto acidental, lavar com água e sabão. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO** Laboratorios MAYMÓ, S.A. Vía Augusta, 302 · 08017 Barcelona (Espanha) · T 34 932 370 220 **Uso veterinário.** Medicamento sujeito a receita veterinária. Administração sob vigilância ou controlo veterinário. Em caso de dúvida, consultar o veterinário.



Preparação fácil adaptada
a todo o tipo de colmeias

Amicel Varroa

Solução para tiras para colmeia

Amitraz 25 mg/ml



Laboratorios APINEVADA, S.L.
Parque Metropolitano Ind. de Granada
Calle los Rubiales, 17
18130 Escúzar - Granada (Espanha)
Tel. +34 858 700 871 - +34 958 771 131

www.apinevada.com



Laboratorios MAYMÓ, S.A.
Vía Augusta, 302
08017 Barcelona (Espanha)
Tel. +34 932 370 220
comercial@maymo.es

www.maymo.es



Amicel Varroa

À base de amitraz, Amicel Varroa está indicado para o tratamento de parasitoses externas causadas pelo ácaro *Varroa destructor*.

Apresenta-se sob a forma de solução (25 mg de amitraz/ml) para tiras para colmeias. A sua **inovadora apresentação farmacêutica** proporciona vantagens significativas em relação a outros medicamentos que contêm a mesma substância ativa.

O tratamento consiste em **2 aplicações** de uma tira de celulose impregnada com 10 ml de Amicel Varroa, com um intervalo de 12 dias entre a primeira e a segunda



Tratamento da colmeia

500 mg de amitraz por colmeia. Esta dose é alcançada aplicando duas tiras por colmeia, cada uma delas contendo 250 mg de amitraz (10 ml).

(1) Aplicar homogeneamente 10 ml de solução na tira, 6 a 12 horas antes de a colocar na colmeia. Deve aplicar-se a solução num dos lados da tira e deixar espalhar e penetrar antes de a colocar na colmeia.

(2a) Colmeias Layens: espalhar o medicamento veterinário homogeneamente e deixar 3 a 4 cm no topo da tira não impregnados, a fim de permitir o fácil manuseamento pelo operador.

(2b) Colmeias Langstroth e Dadant (design vertical): impregnar a tira nos dois sentidos a partir dos vértices, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, dobrando a tira ao meio para a introduzir na colmeia.

(3) Colocação das tiras na colmeia 6-12 horas após a sua preparação.


(4a, 4b) As tiras são colocadas na quadro da colmeia que corresponde ao centro da zona de a criação; o local de colocação da primeira e segunda tiras pode ser coincidente:

- Dia 1: Colocar a primeira tira.
- Dia 12: Colocar a segunda tira.

- Dia 35: Retirar ambas as tiras. Se se observarem resíduos de celulose no fundo da colmeia, removê-los também.


O medicamento deve ser administrado em períodos com pouca criação na colmeia (quando a quantidade de criação na colmeia é baixa).

Não reutilizar as tiras.



VANTAGENS


- **Fácil de preparar.**
- **Adaptado a todo tipo de colmeias** (Layens, Dadant, Langstroth, etc.).



Colocação das tiras nas colmeias Layens e Langstroth.

- **Disseminação rápida da substância ativa na colmeia.** As abelhas trabalham facilmente a celulose, o que permite uma excelente eficácia com 500 mg de amitraz em comparação com outros produtos à base de PVC que necessitam de uma dose mais elevada (1000 mg).
- **Longa duração do tratamento (35 dias) com «Efeito flash» na primeira aplicação.**


Efeito rápido e controlo da *varroa*. A eficácia acumulada após a colocação da 2.ª tira é próxima dos 100%, tanto nos apiários da zona Norte como nos apiários da zona Sul.



- **Não se registaram casos de resistência.**

- **Excelente eficácia.**

Estudos independentes classificam-no como um dos produtos com maior eficácia do mercado. Boa eficácia no terreno, mesmo na presença de criação operculada.



Tratamento	Eficácia provável
Checkmite	34-56%
Amicel Varroa	74-95%
Apitraz	62-82%

Resultados de eficácia em laboratório. (Hernández CS e Gonzalez Cabrera J, 2019). Avaliação da suscetibilidade de *Varroa destructor* aos acaricidas. IX Congresso Nacional de Apicultura.